



**Pergunte ao Euca Expert / Ask the Euca X Pert**

**[www.eucalyptus.com.br](http://www.eucalyptus.com.br)**

**[www.celso-foelkel.com.br](http://www.celso-foelkel.com.br)**

---

**Perguntas / Questions**

---

**Pergunta nº: 1591/Question nº: 1591**

**Título:/Title: Perda de produtividade florestal em rotações sucessivas da floresta de eucalipto**

**Por: / by: Dalmir Albuquerque**

**E-mail: [dalmir.albuquerque@hotmail.com](mailto:dalmir.albuquerque@hotmail.com)**

**Questão: /Question:**

**Boa tarde prof. Foelkel, como vai?**

No segundo e terceiro corte de uma floresta de eucalipto, qual e a perda em porcentagem em metros cúbicos.

**Atenciosamente.  
Dalmir Albuquerque**

---

## **Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:**

**Bom dia Dalmir**, em geral estima-se uma perda entre 7,5 a 25%, tudo dependendo das operações silviculturais que se derem às cepas e brotações: adubação, manejo, combate à mato-competição, etc.

No terceiro corte, as perdas podem ser maiores, dependendo das mesmas causas anteriores e do percentual de brotação das cepas que deverão se manter produtivas em rotações sucessivas.

Se as condições climáticas forem favoráveis, como no estado do Rio Grande do Sul, as perdas de produtividade entre rotações sucessivas são mínimas, mas desde que se maneje bem a floresta sendo conduzida.

**Um abraço**  
**Celso Foelkel**

---